

Aus dem Hygienischen Institut der Universität Marburg a. d. Lahn
(Direktor: Professor Dr. W. Pfannenstiel)

Tierexperimentelle Untersuchungen über einige Wirkungen des Hersfelder Lullus- und Linggbrunnens

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde in der
gesamten Medizin der Hohen Medizinischen Fakultät
der Philipps-Universität Marburg

vorgelegt von

Hans Stern

aus Minden (Westf.)

Marburg a. d. Lahn 1936

Universitäts-Buchdruckerei Joh. Aug. Koch (Dr. C. Hitzeroth)

Angenommen von der Medizinischen Fakultät in Marburg
am 17. Dezember 1936.

Gedruckt mit Genehmigung der Fakultät.

Referent: Professor Dr. W. Pfannenstiel.



Inhaltsübersicht.

I. Einleitung	1
II. Mineralwasser und Kohlehydratstoffwechsel . .	3
III. Mineralwasser und Blutbakterizidie	9
IV. Mineralwasser und Abführwirkung	11
V. Mineralwasser und Körpergewicht	12
VI. Eigene Versuche	
a) Blutzucker	13
b) Blutbakterizidie	16
c) Abführwirkung	19
d) Körpergewicht	20
VII. Schlußbetrachtung	22
VIII. Zusammenfassung	23
IX. Abbildungen	25
X. Tabellen	31
XI. Schriftennachweis	43

Einleitung.

Die neuere Balneologie ist bestrebt, experimentelle Beweise für die meist schon lange bekannte, empirisch gefundene gute Wirkung der Heilquellen zu liefern. Die Zentralstelle für Balneologie forderte sogar, daß eine Heilquelle nur dann als solche bezeichnet werden sollte, wenn ihre Heilwirkung wissenschaftlich begründet werden kann (Pfannenstiel⁸⁷). Diese Forderung stößt auf große Schwierigkeiten. Es sind wohl zahlreiche Arbeiten erschienen, die Einzelwirkungen der Mineralwässer aufgedeckt und die das heutige Wissen in dieser Hinsicht weitergebracht haben. Trotzdem ist sehr vieles hierüber noch unklar. Analytische Einzeluntersuchungen, die sich auf die Teilwirkungen erstrecken, sind unentbehrlich. Bei diesen Einzeluntersuchungen darf jedoch nicht vergessen werden, daß jede Heilquelle als Ganzes betrachtet werden muß. Darum ist schließlich das Endziel aller Arbeiten eine Synthese, die Feststellung der Gesamtwirkungen.

Untersuchungen mit Mineralwässern sind auf die verschiedenartigste Weise unternommen worden. Viele Arbeiten über Beeinflussung des Zuckerhaushaltes liegen vor. Andere Autoren untersuchten die Einwirkung auf die Blutbakterizidie. Perrin und Cuénot⁷⁹) fanden ein Entgiftungsvermögen von Mineralwässern, Kopf⁷⁰) stellte einen Zusammenhang zwischen Hormon- und Mineralwasserwirkung fest, Abelin²) zwischen Schilddrüsenstoffen und verschiedenen Ionen. Dehnicke³⁰) beobachtete eine Änderung des Kationenverhältnisses im Organismus durch Mineralwassertrinkkuren, die durch entsprechende Diät bedeutend verstärkt wurde. Beckmann¹⁶) erklärt eine Anregung der Organtätigkeit als Folge einer Beeinflussung des Säure-Basengleichgewichtes im gesamten Körperhaushalt, besonders bei Zuständen der kompensierten Azidose oder Alkalose. Bei einer Trinkkur mit der alkalischen Ulrikusquelle (Passug) findet Keller-Stoppány⁶⁶) das Säure-Basengleichgewicht nach der basischen, mit der erdigen Magdalenaquelle (Rheinfelden) nach der sauren Seite verschoben. Daneben kommt

es in beiden Fällen zu einer Transmineralisation zwischen Kalzium und Magnesium. Spiro¹⁰⁴⁾ weist auf die mengenmäßig gering in Mineralwässern vorhandenen Elemente hin und sieht in ihnen Katalysatoren, die im Organismus mit seinen zahlreichen Zelloberflächen gute Angriffsmöglichkeiten haben. Nach Simó¹⁰³⁾ werden Froschlaich und verschiedene Pflanzen mehr oder weniger durch Schallerbacher Akratothermen in ihrem Wachstum beeinflusst. J u s a t z⁵⁸⁾ ⁸⁹⁾ berichtet von einem günstigen Effekt der Mineralwasserzufuhr auf den Katalasegehalt des Blutes. Man hat auch niedrig konzentrierte Lösungen von einzelnen Salzen und Salzgemischen auf den tierischen Organismus einwirken lassen, um in den Chemismus des Salzhaushaltes einzudringen (H a r p u d e r⁵²⁾). Ohne weiteres lassen sich die Ergebnisse solcher Versuche nicht auf die Mineralwässer anwenden. H a r p u d e r⁵¹⁾ ⁵³⁾ schreibt dazu in anderen Arbeiten, daß antagonistische und synergische Einflüsse der Neutralsalze angenommen werden müssen, und daß der Effekt eines Brunnens schon nach dieser einen Richtung vom gesamten mineralischen Milieu abhängig ist. Hier müsse die komplizierte Salz-mischung als Ganzes für den Effekt verantwortlich gemacht werden. R o n g e⁹⁵⁾ sagt, daß jede Mineralquelle ein Individuum für sich darstellt, das seiner eigenartigen Zusammensetzung nach als Ganzes zu bewerten ist. Ähnlich äußert sich L a m p e r t⁷¹⁾: Nie dürfen wir ein Mineralwasser nach einem vielleicht in der Menge überwiegenden Bestandteil charakterisieren, wenn auch das eine oder andere Salz in seiner Wirkung stärker zur Geltung kommen mag. Diese Aufzählung von verschiedenen Untersuchungsarten erhebt bei weitem keinen Anspruch auf Vollständigkeit; sie soll nur Kenntnis geben über die Vielfältigkeit der Mineralwasseruntersuchungen.

II. Mineralwasser und Kohlehydratstoffwechsel.

Über den Einfluß von Mineralwässern auf den Zuckerhaushalt liegen zahlreiche Beobachtungen vor. Die angewandten Untersuchungsmethoden sind sehr verschieden. Arnoldi und Ettinger⁹⁾ bestimmten bei Patienten den Blutzuckerspiegel vor und eine halbe bzw. eine ganze Stunde nach dem Trinken von 200 ccm natürlichen Karlsbader Wassers und fanden ihn hinterher meist herabgesetzt, besonders wenn er vorher über die Norm erhöht war. Über Ähnliches berichten Arnoldi und Roubitschek¹¹⁾. Bickel¹⁷⁾ benutzte den Quotienten $C:N$ im Harn (Restquotient, da er bei der Berechnung durch Zugrundelegung des Gesamtkohlenstoffwertes minus Zucker- und Ketonkörperkohlenstoff erhalten wurde), um durch sein Absinken nach einer Trinkkur mit Neuenahrer Sprudel an Kaninchen die günstige antidiabetische Wirkung zu zeigen. Jusat^{22) 59)} wies mit der Blutzuckerkurve nach Staub^{105) 106) 108)} an Kaninchen die blutzuckersenkende Wirkung des Mineralbrunnens „Staatlich Fachingen“ nach, im direkten Versuch nach Jusat konnte er die gleiche Wirkung feststellen. Kauffmann-Cosla und Zörkendörfer^{60) 61) 62) 63) 64) 65)} sahen in ihren Untersuchungen am Menschen den günstigen Einfluß der Karlsbader und Marienbader Glaubersalzquellen auf den Stoffwechsel von Diabetikern in der Erhöhung der Toleranz für Kohlehydrate, im Absinken bzw. Verschwinden des Harnzuckers, im Verschwinden des dysoxydablen Kohlenstoffs im Harn, im Verschwinden der Ketonkörper, im Absinken des pathologisch vermehrten Gesamtkohlenstoffs im Harn zur Norm, ebenso seines Verhältnisses zum Gesamtstickstoff im Harn, im Zurückgehen des Blutzuckers auf normale Werte, in einer deutlichen Phosphorretention im Blut und im Ansteigen des pathologisch erniedrigten respiratorischen Quotienten auf normale Höhe. Weskott¹¹⁵⁾ bestimmte bei Diabetikern den Blutzucker vor und nach dem Trinken von Homburger Elisabethenbrunnen und stellte ein Absinken fest. Erdmann⁴¹⁾ benutzte die Staub'sche Blutzuckerkurve

für seine Untersuchungen mit Fachinger Mineralwasser. Die gleiche Methode wendet Lay⁷²⁾ an, außerdem noch den direkten Versuch nach J u s a t z, um an beiden den blutzuckersenkenden Einfluß von Radeiner Mineralwasser nachzuweisen. Mit Hilfe der beiden zuletzt angegebenen Methoden konnte B u h l a n²⁴⁾ an Kaninchen zeigen, daß der Hersfelder Lullusbrunnen eine ausgezeichnete Wirkung auf den Blutzuckerspiegel im Sinne einer Senkung ausübt. Über diese Versuche von B u h l a n wird unten noch weiter berichtet.

Die meisten dieser Quellen, die eine blutzuckersenkende Wirkung aufweisen, sei es bei Diabetes, sei es bei alimentär erhöhtem, in geringerem Maße auch bei normalem Blutzuckerspiegel, sind alkalische Glaubersalzquellen. Es hat auch nicht an Versuchen gefehlt, bei denen mit künstlichen Elektrolytgemischen gearbeitet wurde. A b e l i n und G o l d e n e r³⁾ fanden eine hypoglykämische Wirkung eines hauptsächlich Natriumchlorid, Natriumbikarbonat und Natriumsulfat enthaltenden Gemisches, das also einer alkalischen Glaubersalzquelle nahesteht. A r n o l d i und E t t i n g e r⁹⁾ konnten mit künstlichem Karlsbader Salz, mit Natriumsulfat, mit Natriumcitrat und mit Natriumbikarbonat, G e i g e r und K r o p f⁴⁸⁾ mit neutralisiertem Karlsbader Wasser, wie auch mit einer Lösung der wichtigsten Kationen (K^+ , Na^+ , Mg^{++} , Ca^{++}) dieses Wassers, jedoch ausschließlich in Form der Chloride, ähnliche Wirkungen auf den Blutzuckerspiegel erreichen wie mit dem natürlichen Karlsbader Heilbrunnen. Diese Untersuchungen sind wohl in mancher Hinsicht wertvoll, dürfen aber nicht dazu führen, an Stelle der natürlichen Heilquellen diesen künstlich nachgeahmte Salzlösungen zu therapeutischen Zwecken zu verwenden; denn es gibt genug Untersuchungsergebnisse, die zeigen, daß natürliche Heilwässer und künstliche Salzgemische, in Wasser gelöst, bei gleicher Zusammensetzung oft ganz verschiedene Wirkungen entfalten (V o g t¹¹³⁾).

Fragt man sich, wie der günstige Einfluß der Mineralwässer auf den Zuckerhaushalt zustandekommt, so ist wahrscheinlich das primäre, daß die alkalischen Mineralwässer — auch die eben erwähnten Salzgemische — nach ihrer Aufnahme durch die Darmwand das Säure-Basengleichgewicht nach der basischen Seite verschieben (A r n o l d i und R o u b i t s c h e k¹³⁾ ⁹⁸⁾, K e l l e r - S t o p p a n y⁶⁶⁾). Dieser Vorgang bedingt sekundär ein Absin-

ken des Blutzuckers (Arnoldi⁵), das sich auch durch intravenöse Alkaliinfusion erreichen läßt (Elias und Kolb³⁵). Das Absinken des Blutzuckers konnten Blum und Aubel¹⁹) nach großen Alkaligaben allerdings in ihren Versuchen nicht bestätigen. Tertiär wird das Oxydationsvermögen der Zellen für Zucker gesteigert (Bickel¹⁷), Arnoldi⁵). Ist dagegen das Säure-Basengleichgewicht nach der sauren Seite verschoben, z. B. bei Kaninchen durch saure Asche bildendes Futter wie Hafer und Brot (Page⁷⁸), so steigt der Blutzuckerspiegel an, das Oxydationsvermögen der Zellen sinkt (Elias³⁴). In beiden Fällen, gleich ob das Säure-Basenverhältnis des Blutes nach der sauren oder nach der alkalischen Seite verschoben ist, ändert sich die aktuelle chemische Reaktion nicht, da das Blut infolge seines starken Pufferungsvermögens an seiner Wasserstoffionenkonzentration festhält (Harpuder⁵¹ 53)). Nur die Titrationsalkalität bzw. -azidität zeigt dabei Änderungen, so daß man von einer kompensierten Alkalose bzw. Azidose sprechen kann (Beckmann¹⁶), Harpuder⁵¹). Wird das Säure-Basenverhältnis nach der alkalischen Seite verschoben, setzt sofort der Ausgleichsmechanismus des Körpers ein, das heißt, die Kohlensäurebindungskurve steigt an (Arnoldi und Roubitschek¹³ 97), und es wird weniger Kohlensäure durch die Lungen abgegeben (Beckmann¹⁶), Harpuder⁵³). Außerdem werden mehr basische Stoffe durch die Nieren ausgeschieden, die Wasserstoffionenkonzentration des Harns steigt (Arnoldi und Roubitschek¹³), Harpuder⁵³). Infolge dieser Regulierungsvorrichtungen des Körpers kann eine einmalige Zufuhr eines alkalischen Mineralwassers die Zusammensetzung des Blutes nicht für längere Zeit beeinflussen. Etwas anderes ist es, wenn das Mineralwasser während eines längeren Zeitraumes ständig genossen wird, dann ist die Wirkung einer solchen Kur auf den Blutchemismus auch von längerer Dauer.

Arnoldi und Roubitschek⁶ 11) 12) sehen die Stoffwechselveränderungen beim Diabetes als eine Störung der Zuckertransportverhältnisse an. Der Zucker gelangt nicht an die Orte der Verbrennung, er staut sich im Blut, da die Gewebe für den Zucker schwerer durchlässig sind. Arnoldi vermutet, daß diese Störung auf einer Grenzflächenalteration des Zellprotoplasmas beruht. Arnoldi und Ettinger⁹) führen diese abweichende Permeabi-

lität auf eine Änderung des gegenseitigen Verhältnisses von $K : Na, Ca$ usw. zurück, wodurch die kolloidchemische Struktur der Zellgrenzflächen beeinflusst wird (Arnoldi und Roubitschek⁴¹⁾). Die Permeabilität der Froschleberzellen für Glucose fanden Geiger und Loewi⁴⁹⁾ beim Durchströmen mit Diabetikerblut aufgehoben im Gegensatz zu normalem Blut. Diese Versuche sprechen für Arnoldi's Ansicht, ebenso Untersuchungen von Hamburger⁵⁰⁾, nach denen die Glomerulushaut der Froschniere sogar stereoisomeren Zuckern gegenüber verschiedene Durchlässigkeit zeigt. Arnoldi erklärt die Wirkung des Karlsbader Wassers auf den Kohlehydratstoffwechsel beim Diabetiker in einer günstigen Beeinflussung des Zuckezuflusses ins Blut und des Zuckerabflusses ins Gewebe, ersichtlich aus dem Ablauf der Blutzuckerkurve, da die Höhe des Blutzuckerspiegels an sich nicht ohne weiteres nach Freund und Marchand⁴⁴⁾ einen Schluß auf die Größe der Zuckerverbrennung zuläßt.

Nach Bickel¹⁹⁾, Kauffmann-Cosla¹⁹⁾ 60) 64) und Zörkendörfer⁶⁰⁾ 64) ist auch das Oxydationsvermögen der Zellen beim Diabetes vermindert. Die Verminderung drückt sich in einer Urinausscheidung von nicht oxydiertem Kohlenstoff aus. Daher rechnen diese Autoren den Diabetes zur Gruppe der dysoxydativen Carbonurie. Die günstige Wirkung der Mineralwässer führen sie auf das durch diese gesteigerte Oxydationsvermögen zurück.

Neben den Einflüssen von Trinkkuren mit alkalischen Wässern auf den Blutzuckerspiegel und das Oxydationsvermögen der Zellen wird auch die Assimilationsfähigkeit der Leber für Glykogen bei kohlehydratreicher Kost erhöht und ihr Fettgehalt vermindert, wie Arnoldi⁷⁾ 8) 10) an Kaninchen und Ratten zeigen konnte. Umgekehrt sinkt der Glykogengehalt der Leber nach Einwirkung geringer Säuremengen oder saure Asche bildender Kost (Elias³³⁾, Page⁷⁸⁾). Das Muskelglykogen erscheint dagegen resistenter (Elias und Schubert³⁸⁾).

Elias und Mitarbeiter³⁶⁾ 37) 39) 40) konnten durch intravenöse Injektionen von primärem und sekundärem Natriumphosphat im Tierversuch und an Menschen alimentär und diabetisch erhöhten Blutzucker herabsetzen, nicht dagegen den normalen. Peroral verabfolgt waren die Phosphatmengen, die keine Darmwirkung entfalten, zu

klein, um die Hyperglykämie zu vermindern. Damit sind die Beobachtungen von Kauffmann-Cosla und Zörkendörfer^{61) 62) 63)} in Einklang zu bringen, die bei Diabetikern unter dem Einfluß einer Karlsbader oder Marienbader Kur die erhöhte Phosphorausscheidung im Urin wieder zurückgehen sahen, ähnlich wie es bei der Insulinwirkung der Fall ist. Es kommt sogar zu einem Phosphatansatz, trotzdem nicht vermehrt Phosphate zugeführt werden (Mayer⁷⁴⁾, Sgalitzer¹⁰¹⁾, Stransky¹⁰⁹⁾, Wiechowski^{116) 117)}). Daß diese Wirkung zum größten Teil auf dem Überwiegen des Sulfations im Karlsbader Wasser beruht, geht aus Kontrollversuchen hervor. Mayer sieht die Senkung des Blutzuckers daher als Phosphatwirkung an. Veil¹¹²⁾ vermutet nach Beobachtung einer Chlorstörung beim Diabetes, daß die Störung des Zuckerstoffwechsels hierbei mit Störungen im Mineralstoffwechsel eng verkettet sein kann.

Minkowski⁷⁷⁾ und Weskott¹¹⁵⁾ fassen die günstige Wirkung von Mineralbrunnen auf den Diabetes als eine Wechselwirkung zwischen Salzen und Kolloiden auf, wobei eine Umwandlung der Glucose in eine reaktionsfähigere Form durch Änderung des Elektrolytgleichgewichtes erfolgt.

Ein der Wirkung der alkalischen Glaubersalzquellen ähnlicher Einfluß auf den Blutzucker, Alkalireserve und Leberglykogen ließ sich auch durch perorale und parenterale Verabreichung von Schwefel erzielen (Bürgi^{25) 26)} und Gordonoff²⁶⁾, Campanacci und Balducci²⁷⁾). Die Untersuchungen von Abel und Geiling¹⁾ lassen sich damit in Zusammenhang bringen, nach denen nämlich die Wirksamkeit des Insulins von seinem Gehalt an leicht abspaltbarem Schwefel abhängig ist.

Bei der Behandlung von Diabetikern in den Kurorten spielt neben der Trinkkur die Badekur eine große Rolle. Auch durch diese läßt sich eine Vergrößerung der Alkalireserve und damit eine Senkung des Blutzuckerspiegels bei Diabetikern erreichen (Felsch^{42) 43)}, Messerle⁷⁵⁾, Diener und Witsch³¹⁾, Buchstab und Sribner²³⁾, Beckmann¹⁶⁾, Arnoldi⁵⁾).

Nach Durchsicht der angegebenen Arbeiten kann man sich die Wirkung der alkalisch-sulfatischen Quellen auf den Kohlehydrathaushalt beim Diabetes folgendermaßen denken, wie Arnoldi es angibt: Nach der Resorption

der Ionen vom Darm ins Blut kommt es zu einer Änderung im Ionenverhältnis des Blutes. Das Säure-Basengleichgewicht wird von der sauren nach der alkalischen Seite verschoben. Es folgt eine erhöhte Glykogenspeicherung der Leber, eine Steigerung der Kohlehydratverbrennung und damit ein Sinken des Blutzuckerspiegels. Ob diese Wirkungen letzten Endes auf Herstellung von günstigen Bedingungen für die Insulinwirkung oder auf vermehrter oder beschleunigter Insulinproduktion, also besserem Arbeiten des Pankreas, oder auf Änderung der Permeabilität der Zellgrenzen für die Glucose oder auf Bildung einer reaktionsfähigeren Form der Glucose beruht, bleibt vorläufig noch ungeklärt. Es scheinen aber neben den Kationen auch die Anionen der Mineralwässer eine Rolle dabei zu spielen.

Für die Charakterisierung einer hypoglykämischen Wirkung eines Mineralbrunnens genügt wohl die Bestimmung des Blutzuckers vor und nach der Kur, besonders in Form der Doppelbelastungskurve nach Staub. Die anderen Erscheinungen wie Änderung des Harnquotienten, des Gesamtkohlenstoffs im Harn usw. stehen mit dem Verhalten des Blutzuckers unmittelbar im Zusammenhang. Wird also der Blutzuckerspiegel gesenkt, schwinden auch diese anderen pathologischen Erscheinungen.

III. Mineralwasser und Blutbakterizidie.

Die am Anfang und am Ende einer Trinkkur mit einem Mineralbrunnen vorgenommene Bestimmung der Bakterizidie als einem Maßstab für die allgemeine Resistenz des Körpers dürfte für die Kenntnis der Wirkung des betreffenden Brunnens von Wichtigkeit sein. Pfannenstiel⁸⁷⁾ ⁸⁸⁾ ⁸⁹⁾ konnte mit Hilfe der Wright'schen¹¹⁸⁾ Methode an vorher durch Mangelfutter in ihrer Resistenz geschwächten Kaninchen eine steigernde Wirkung des Mineralbrunnens „Staatlich Fachingen“ auf die Blutbakterizidie gegenüber Staphylokokken feststellen. Maßgebend für die bakterizide Kraft ist die chemische bzw. physikalisch-chemische Beschaffenheit der Körpersäfte, von Pfannenstiel⁸⁰⁾ ⁸⁴⁾ ⁸⁵⁾ als „Serumstatus“ bezeichnet. Hervorragend beteiligt an der Aufrechterhaltung des Serumstatus ist das retikulo-endotheliale System (Pfannenstiel⁸⁸⁾). Der bakterizide Index läßt sich besonders gut steigern beim geschwächten Organismus durch Zufuhr von Vitaminkombinationen (Pfannenstiel⁸⁰⁾ ⁸²⁾ ⁸³⁾ ⁸⁴⁾ ⁸⁵⁾, Holsen⁵⁵⁾) und durch Injektion von nur schwer wieder ausscheidbaren Substanzen (Pfannenstiel⁸⁰⁾). Anreicherung von Kalzium, Magnesium und Kalium erhöhen ebenso wie schwache Säuren die Blutbakterizidie, während diese durch eine Vermehrung von Natrium auf Kosten von Kalzium und Kalium herabgesetzt wird (Pfannenstiel⁸⁰⁾). Scholz⁹⁹⁾ fand eine Erhöhung nach Verabfolgung von Magnesiumsulfat, Alston⁴⁾ nach Injektion von Serum und anderen Stoffen. Hilgenberg und Pfannenstiel⁵⁵⁾ stellten fest, daß in der Schwangerschaft die Bakterizidie gegenüber Milzbrandbazillen erhöht ist und mit einer Vermehrung der Globuline auf Kosten der Albumine einhergeht. Die Bakterizidiesteigerung auf Morphininjektionen hin führen Eichhoff und Pfannenstiel³²⁾ auf aktive Zellarbeit zurück. Hierher gehören auch Beobachtungen von Tunncliffe¹¹⁰⁾, die nach intravenöser Injektion von Kalziumglukonat, Kalziumchlorid, Natriumjodid. Dex-

trose und Neosalvarsan einen erheblichen Anstieg der Leukozytenphagozytose im Blut feststellte. Nach Harpuder und Schiering⁵⁴⁾ wird durch Wiesbadener Thermalbäder der Alexingehalt des Blutes vermehrt.

Über die Konstitution der bakteriziden Stoffe wissen wir so gut wie nichts. Vielleicht spielt eine Kapillarerweiterung und dadurch besserer Stoffaustausch zwischen Blut und Gewebe eine Rolle (Pfannenstiel^{80) 81)}). Die Mineralwasserwirkung auf die Bakterizidie dürfte nach diesen Ausführungen wahrscheinlich auf eine Änderung des Mineraliengleichgewichtes im Blut zurückzuführen sein, auf eine Transmineralisation.

IV. Mineralwasser und Abführwirkung.

Die Abführwirkung beruht bei Mineralbrunnen hauptsächlich auf dem Gehalt an Natriumsulfat und Magnesiumsulfat und läßt sich nach den Feststellungen vieler Autoren wie folgt kurz zusammenfassen: Natrium- und Magnesiumsulfat sind schwer resorbierbar und halten infolge ihres osmotischen Druckes ihr Lösungswasser fest. Im Dünndarm findet durch die Sulfate eine starke Sekretion von Darmsaft statt, im Dickdarm nur eine geringe Rückresorption des Wassers. Durch den Wassergehalt sind die Stühle breiig oder flüssig. Infolge des großen Flüssigkeitsinhaltes im Darm kommt es auch zu einer stärkeren Peristaltik. Ein Teil der beiden Sulfate wird besonders im Dickdarm und bei höher konzentrierten Mineralwässern resorbiert. Es kommt auch zu einer Hyperämie der Darmschleimhaut (Buchheim²¹⁾ ²²⁾, Cobet²⁸⁾, Liebig⁷³⁾, Meyer-Betz und Gebhardt⁷⁶⁾, Pisseuille⁹⁰⁾, Porges⁹¹⁾, Rademaekers und Sollmann⁹³⁾, Radziejewski⁹⁴⁾, Seegen¹⁰⁰⁾, Sick¹⁰²⁾, Wagner¹¹⁴⁾). Hofmeister⁵⁶⁾ fand, daß die schwer resorbierbaren Salze durch Wasserentzug stärker eiweißfärend wirken als die leicht resorbierbaren, dadurch die Schleimhaut schrumpfen lassen, wodurch letztere undurchlässiger wird. Vielleicht spielt bei der Abführwirkung des Glauber- und Bittersalzes auch der in geringer Menge durch Reduktion der Sulfate im Darm entstandene Schwefelwasserstoff eine Rolle (von Bokai²⁰⁾, Kochmann⁶⁹⁾, Zörkendörfer¹²²⁾ ¹²⁴⁾). Chlorionen enthaltende Mineralwässer wirken stärker abführend, da das Kochsalz in den oberen Darmabschnitten fast unresorbierbar ist und hier äquivalente Mengen Magnesiumsulfat vertreten kann (Kionka⁶⁷⁾). Im übrigen ist die Konzentration der Wässer nicht einerlei. Zörkendörfer¹¹⁹⁾ ¹²⁰⁾ ¹²¹⁾ ¹²³⁾ unterscheidet das Verhalten von hypotonischen, isotonischen und hypertonischen Quellen im Darm: Bei isotonischen Mineralwässern entspricht das Verhalten dem eben angegebenen, kleine Mengen werden allerdings fast ganz resorbiert, große größtenteils durch den Darm nach

außen entleert. Von hypotonischen Wässern wird das Lösungswasser schnell bis zur Isotonie resorbiert; dann verhalten sie sich wie isotonische. Um eine Abführwirkung zu erzeugen, sind allerdings größere Mengen hypotonischer Wässer nötig. Bei hypertotonischen Quellen geht der Ausgleich zur Isotonie durch Resorption der Salze langsamer vor sich als bei hypotonischen durch Wasserresorption. Kleine Mengen bedingen keinen peristaltischen Dehnungsreflex; sie genügen aber zur Abführwirkung, wenn genügend Flüssigkeit darauf zugeführt wird. Nach Collum²⁰⁾ und Barcroft¹⁵⁾ kommt außerdem noch eine Wirkung auf die Darmwand in Frage. Bittersalzwässer sind stärker wirksam als Glaubersalzwässer (Harpunder⁵¹⁾). Pouls⁹²⁾ erwähnt, daß langdauernder Gebrauch von Glauber- und Bittersalzen dyspeptische Symptome erzeugt, den Appetit herabsetzt und zuweilen eine hartnäckige Obstipation hinterläßt. Sind wie in natürlichen Mineralwässern gleichzeitig Chlornatrium und Alkalikarbonate zugegen, so treten diese schädlichen Folgen nicht ein, sondern die Wirkung ist im Gegenteil bei verschiedenen Verdauungskrankheiten sehr günstig.

V. Mineralwasser und Körpergewicht.

Simó¹⁰³⁾ hielt Froschlaich in Thermalwasser (Schallerbacher Akratotherme) und stellte anfangs eine Wachstumsförderung fest gegenüber dem in Sumpfwasser gehaltenen Kontrolllaich, von der dritten Woche ab trat aber eine Schädigung ein. Die von ihm mit Thermalwasser begossenen Pflanzen keimten im Durchschnitt einen Tag früher als die Kontrollen, Weizen und Roggen erfuhren eine dauernde Wachstumsförderung, Bohnen dagegen nicht.

VI. Eigene Versuche.

a) Blutzucker.

Die Versuchsanordnung war dieselbe, wie sie J u s a t z ⁵⁹⁾, L a y ⁷²⁾ und B u h l a n ²⁴⁾ angewandt hatten. Als Versuchstiere dienten Kaninchen, die durch eine achttägige Fütterung mit gekochten Kartoffeln vorbereitet wurden. Hierdurch läßt sich bei diesen Tieren eine alimentäre Hyperglykämie erzeugen und die Zuckertoleranz herabsetzen (Geiger und Kropff ⁴⁶⁾ ⁴⁷⁾). Zu Beginn der eigentlichen Versuche, also nach der achttägigen Kartoffelfütterung, ermittelte ich im Doppelbelastungsversuch die Blutzuckerkurve nach Staub ¹⁰⁵⁾ ¹⁰⁶⁾ ¹⁰⁷⁾ ¹⁰⁸⁾). Dazu wurde den Kaninchen morgens nüchtern — das letzte Futter hatten sie am vorhergehenden Nachmittag bekommen — Blut aus einer Ohrvene entnommen. Gleich anschließend erhielten sie eine Lösung von vier Gramm Glukose auf ein Kilogramm Körpergewicht in 30 ccm körperwarmen Leitungswassers mit einer Rekordspritze durch eine Sonde in den Magen. Alle halbe Stunde fand wieder eine Blutentnahme statt. Nach der fünften Blutentnahme, also zwei Stunden seit Beginn des Versuches, wurden die Kaninchen in der gleichen Weise wie das erste Mal mit Glucose belastet. Ich entnahm jetzt noch dreimal Blut, und zwar eine halbe, eine ganze und zwei Stunden nach der zweiten Belastung, sodaß die letzte Blutentnahme vier Stunden nach Versuchsbeginn stattfand. Die nächsten acht Tage erhielten die Kaninchen weiter nur Kartoffeln als Futter. Dazu bekamen sie am Untersuchungstage 25 ccm, am folgenden Tage 30 ccm, dann 40 ccm und die nächsten Tage immer 50 ccm Brunnen, insgesamt acht Tage lang, mit der Schlundsonde intrastomachal eingeführt. Eine zweite Kaninchenreihe wurde zur Kontrolle in der gleichen Weise mit Leitungswasser behandelt. Am Tage nach der letzten Brunnenzufuhr bekamen die Kaninchen wieder nüchtern wie das erste Mal zwei Glucosebelastungen. In den entnommenen Blutproben wurde der Zuckergehalt nach dem Verfahren von Urbach ¹¹¹⁾ mit dem Zeiß'schen Stufenphotometer ermittelt: 0,1 ccm Blut

wird mit einer Wolframmolybdänsäurelösung enteiweißt, die Lösung zentrifugiert und der klare Blutextrakt mit bisulfithaltigem Kupferreagens gemischt, dann erhitzt, wobei die Glucose des Blutes das Kupfer des Kupferreagens zu Cu_2O reduziert. Als Farbreagens kommt eine Phosphormolybdänsäurelösung hinzu, die von dem gebildeten Cu_2O unter Bildung einer blauen Farbe reduziert wird. Zum Schluß gibt man Wasser zu und bestimmt die Lösung 15 Minuten bis $1\frac{1}{2}$ Stunden später im Stufenphotometer mit dem Filter S 61. Den ermittelten Trommelwert liest man in einer Tabelle als mg % Blutzucker ab. Dieses Verfahren war einfacher und geeigneter als die Bestimmung nach Hagedorn und Jensen. Lay⁷²⁾ und Buhlan²⁴⁾ hatten mit der Urbach'schen Methode bereits gute Erfahrungen gemacht und in Vergleichsbestimmungen mit beiden Methoden und an Glucosestandardlösungen hinreichende Genauigkeit gefunden.

Außer dem Einfluß einer achttägigen Brunnenzufütterung auf den alimentär erhöhten Blutzucker wurde die Brunnenwirkung auf letzteren auch im direkten Versuch nach J u s a t z⁵⁹⁾ geprüft. Hierbei löst man die Glucose nicht in Leitungswasser, sondern direkt im Mineralbrunnen. Es findet nur eine Doppelbelastung statt an Kaninchen, die wie oben acht Tage lang vorher nur gekochte Kartoffeln als Futter bekommen haben.

Bei allen Versuchen achtete ich darauf, daß sämtliche Tiere unter gleichen Bedingungen standen. Die Untersuchungen fanden von Mitte Juni bis Mitte August statt, sodaß große Temperaturschwankungen vermieden wurden, obwohl nach Geiger⁴⁵⁾ und Kisch⁶⁸⁾ der Blutzucker durch ziemlich erhebliche Temperaturschwankungen kaum beeinflußt wird. Die Tiere bekamen ihren Brunnen immer gleich langsam eingeführt, um dadurch verschiedene Wirkungen auszuschalten, wie sie Arnoldi und Zimmermann¹⁴⁾ am Salzschrifer Bonifatiusbrunnen bei schnellem und langsamem Trinken ermittelt hatten.

Bei der ersten Versuchsreihe bekamen die Kaninchen Linggbrunnen ohne Kohlensäure, wie er natürlich vorkommt (Abbildung 1, 2 und Tabelle 1). Dabei zeigte sich, daß der Nüchternwert durch den Brunnen bei allen sieben Tieren regelmäßig, zum Teil sogar beträchtlich gesenkt wurde. Der Verlauf der ganzen Kurve war bei den einzelnen Kaninchen verschieden. Bei

zwei Tieren (Nr. 8 und 9) verlief die Kurve nach der Brunnenzufuhr ganz unter der ersten Kurve. Tier 6 dagegen zeigte mit Ausnahme des nur um 14 mg% gesenkten Nüchternwertes einen höheren Verlauf der zweiten Kurve. Bei den übrigen Tieren überschritten sich die beiden Kurven mehrmals, die zweiten Kurven lagen aber bei Tier 10 und 11 größtenteils unter den ersten. Bei fünf der sieben Tiere zeigten die Vierstundenwerte nach der achttägigen Brunnenkur eine beträchtliche Herabsetzung. Insgesamt läßt sich daraus eine blutzuckersenkende Wirkung des Linggbrunnens ohne Kohlensäure ablesen, die aber nicht so stark ist, wie sie Buhlan beim enteisenten, kohlensäurefreien Lullusbrunnen in der gleichen Versuchsanordnung hatte feststellen können.

Im direkten Versuch ließ der natürliche Linggbrunnen ohne Kohlensäurezusatz keine deutliche Wirkung erkennen (Abbildung 3, Tabelle 2). Die Vierstundenwerte lagen nicht ein einziges Mal unter dem Nüchternwert, wie es Juszatz⁵⁹⁾ dagegen beim Fachinger Wasser und Lay⁷²⁾ beim Radeiner gefunden hatten. Außerdem stieg beim Linggbrunnen die Blutzuckerkurve nach der zweiten Belastung wieder an, erreichte allerdings nur einmal die Höhe wie nach der ersten Belastung. Ähnlich hatte Buhlan das Verhalten des Lullusbrunnens ohne Kohlensäure gefunden. Man kann hier, wenn man überhaupt von einer Wirkung auf den Blutzucker sprechen will, diese nur als sehr geringfügig bezeichnen.

Der Linggbrunnen mit künstlich zugesetzter Kohlensäure wurde ebenfalls in beiden Versuchsanordnungen geprüft. Nach einer achttägigen Fütterung der Kaninchen mit diesem (Abbildung 4, 5, Tabelle 3) wies nur eines von den drei Kaninchen eine geringe Senkung des Blutzuckernüchternwertes auf, der Vierstundenwert war dagegen bei allen drei Tieren, bei Tier 15 und 17 sogar beträchtlich gesenkt. Bei Kaninchen 17 verlief die zweite Kurve ganz, bei Nr. 15 mit Ausnahme der ersten beiden Werte und bei Nr. 16 in der zweiten Hälfte unter der ersten Kurve. Wenn man die Befunde dieser Versuche mit den Resultaten vergleicht, die mit dem kohlensäurefreien Linggbrunnen erzielt worden waren, so läßt sich mit Ausnahme der Nüchternwerte, die hier weniger herabgesetzt sind, eine ähnliche blutzuckersenkende Wirkung des kohlensäurehalti-

gen Linggbrunnens beobachten. Diese Ergebnisse sind auffällig, da Buhl an mit kohlenensäurehaltigem Lullusbrunnen keine Wirkung auf den Blutzuckerspiegel feststellen konnte, während der Lullusbrunnen ohne Kohlensäure eine solche Wirkung sehr deutlich erkennen ließ.

Im direkten Versuch verhielt sich der Linggbrunnen mit Kohlensäure noch schlechter als der kohlenensäurefreie (Abbildung 6, Tabelle 4). Nach der zweiten Belastung erreichte der Blutzucker bei allen drei Tieren höhere Werte als nach der ersten Belastung, und die Vierstundenwerte lagen jedesmal beträchtlich über den Nüchternwerten.

In weiteren Versuchen erhielten die Kaninchen acht Tage lang gleichzeitig Lingg- und Lullusbrunnen, beide ohne Kohlensäure, im Verhältnis 1:2, wie sie auch in Bad Hersfeld von Patienten getrunken werden (Ronge⁹⁶). Die Zufuhr des Lullusbrunnens erfolgte 10—15 Minuten nach der des Linggbrunnens. Hierbei zeigte sich kein deutlicher Einfluß des Linggbrunnens auf den Lullusbrunnen (Abbildung 7, 8, Tabelle 5). Der Ablauf der zweiten Blutzuckerkurve war so, wie sie Buhl an mit Lullusbrunnen ohne Kohlensäure allein erhalten hatte.

Bei den Kaninchen, die zur Kontrolle in gleicher Weise Leitungswasser wie die eben angeführten Tiere ihren Brunnen bekommen hatten, war nach der achttägigen Einverleibung des Leitungswassers keine Veränderung der Blutzuckerkurve erkennbar (Abbildung 9, Tabelle 6). Die Nüchtern- und Vierstundenwerte lagen im Höchstfalle 9 mg% auseinander. Aus diesem Ergebnis der Kontrollen mit Leitungswasser ergibt sich, daß die Beeinflussung des Blutzuckers durch Linggbrunnen mit oder ohne Kohlensäure ebenso wie die durch gleichzeitige Verabfolgung von Lingg- und Lullusbrunnen erzielte Senkung nicht auf einer Hydrämie beruhen kann, sondern eine spezifische Brunnenwirkung ist.

b) Blutbakterizidie.

Zur Untersuchung des Lullus- und Linggbrunnens in ihrer Wirksamkeit auf die Blutbakterizidie wurden ebenfalls Kaninchen benutzt. Die Versuchsanordnung war ähnlich, wie sie Pfannenstiel⁸⁷) für seine Untersuchungen verwandt hatte. Die Tiere bekamen vier Wo-

chen lang vor Versuchsbeginn morgens Kleie und nachmittags Hafer. Beide Futtermittel wurden zuvor eine Stunde lang im Autoklaven einer Temperatur von 120° ausgesetzt, um sie in ihrem Vitamingehalt zu schädigen. Als Unterlage diente den Kaninchen Torfmull. Auf diese Weise wurden die Tiere in einen erholungsbedürftigen („aneubiotischen“) Zustand versetzt. Durch die Bestimmung der keimfeindlichen Kraft des Blutes (Bakterizidie) nach Wright¹¹⁸⁾ suchte ich den Einfluß der Mineralbrunnen auf die Resistenz festzustellen. Nach der Vorbehandlung der Kaninchen durch Mangelfutter wurde ihnen nüchtern Blut durch Herzpunktion entnommen und der bakterizide Index bestimmt. Nun erhielten die Tiere 18 bis 26 Tage lang täglich neben ihrem Mangelfutter den betreffenden Brunnen mit der Schlundsonde unmittelbar in den Magen, beginnend mit 30 ccm am Tage nach der Herzpunktion, am nächsten Tage 40 ccm, dann immer 50 ccm. Am Schluß dieser Periode der Brunnenzufuhr wurde wieder mittels Herzpunktion den Tieren Blut entnommen und der bakterizide Index ermittelt.

Die Bestimmung des bakteriziden Index nach Wright¹¹⁸⁾ geht kurz folgendermaßen vor sich: Das durch Schlagen defibrinierte Blut mischt man mit einer bestimmten Aufschwemmung hämolytischer Staphylokokken in drei verschiedenen Verdünnungen und bringt die Mischung in kapillare Kammern, in denen sie 24 Stunden bei 37° bebrütet werden. Jede Verdünnung wird in doppelter Anzahl hergestellt, sodaß insgesamt sechs Kammern vorhanden sind. Die gleichen Verdünnungen, wie sie zur Beimpfung der Blutkammern verwandt wurden, bringt man auf Agarplatten, die ebenfalls bei 37° 24 Stunden lang bebrütet werden. In den Blutkammern werden die gewachsenen Staphylokokkenkolonien gezählt und aus je zwei entsprechenden Verdünnungen der Mittelwert bestimmt. In entsprechender Weise werden die Kontroll-Agarplatten ausgewertet. Durch Dividieren des Mittelwertes der Kolonien auf den Platten durch den Mittelwert der Kolonien in den Kammern erhält man drei Zahlen. Der Durchschnittswert dieser drei Zahlen ist dann der bakterizide Index.

Auf die Zufuhr von L u l l u s b r u n n e n o h n e K o h l e n s ä u r e verhielt sich die Bakterizidie nicht ganz einheitlich (Tabelle 7.). Bei zwei (Nr. 42 und 46) von den sechs Kaninchen fand eine deutliche Steigerung der Bakterizidie

statt, bei Tier 43 nur eine geringe. Die andern drei Tiere wiesen demgegenüber ein geringes Absinken des bakteriziden Index auf. Anders war die Wirkung des Lullusbrunnens mit Kohlensäure, durch dessen Einverleibung fünf von sechs Tieren einen erheblichen Anstieg des Index erfuhren. Nur bei einem Tier (Nr. 41) sank der Index etwas. Der Lullusbrunnen mit zugesetzter Kohlensäure verursacht also im Gegensatz zum kohlenstofffreien Brunnen eine deutliche Steigerung der Bakterizidie.

Ähnlich sind die Verhältnisse beim Linggbrunnen (Tabelle 8). Ohne Kohlensäure bewirkt der Linggbrunnen keine Erhöhung der Bakterizidie des Blutes. Im Gegenteil, bei sechs Tieren sinkt der Index ab, bei den beiden andern (Nr. 29 und 32) bleibt er ungefähr wie vor der Brunnenzufuhr. Durch den kohlenstoffhaltigen Linggbrunnen erfährt der bakterizide Index bei allen fünf Tieren eine Steigerung, die bei der Mehrzahl der Tiere ganz erheblich ist.

Zur Kontrolle bekamen fünf Kaninchen gewöhnliches Leitungswasser, vier weitere Leitungswasser, das unter einem Druck von $2\frac{1}{2}$ Atmosphären mit Kohlensäure versetzt war (Tabelle 9). Unter demselben Druck steht auch die dem Lullus- und Linggbrunnen in Bad Hersfeld zugesetzte Kohlensäure. Die Kaninchen, die gewöhnliches Leitungswasser erhalten hatten, zeigten nur geringe Schwankungen ihrer Blutbakterizidie. Durch das mit Kohlensäure versetzte Leitungswasser stieg bei zwei Tieren (Nr. 53 und 59) der Index ein wenig, bei einem dritten (Nr. 52) etwas stärker an. Dafür sank er bei Tier 45 von 2,00 auf 1,33 ab.

Im ganzen betrachtet kann man bei Lullus- und Linggbrunnen ohne Kohlensäure von einer Wirkung auf die Blutbakterizidie kaum sprechen. Mit Kohlensäure versetzt verhalten sich beide Brunnen ganz anders, indem sie nunmehr die Bakterizidie erheblich steigern; besonders vom Linggbrunnen kann man das sagen, aber der Lullusbrunnen steht nicht viel hinter ihm zurück. Daß die Kohlensäure nicht allein die Ursache der Bakterizidiesteigerung ist, beweisen die Leitungswasserkontrollen mit Kohlensäurezusatz, bei denen die Zunahme des Index ganz unbedeutend ist. Im Lullus- sowie im Linggbrunnen dürfte die günstigere Bindung der Kohlensäure an das Mineralwasser für die deutliche Steigerung des bakteriziden Index verantwortlich sein.

c) Abführwirkung.

Die Untersuchungen auf Abführwirkung der Brunnen wurden an jungen weißen Ratten vorgenommen. Die Ratten saßen alle in Einzelkäfigen und erhielten acht Wochen lang als Futter Brot, dem vor dem Backen zur Abstumpfung der Säure auf ein Kilogramm 20 Gramm Calcium lacticum zugesetzt war. Die gefressene Menge wurde alle acht Tage bestimmt, indem morgens vor der Fütterung das für jede Ratte bestimmte Brotquantum und am nächsten Morgen das nicht von ihr gefressene Brot gewogen wurde. Aus der Differenz ergab sich die aufgenommene Menge des Brotes. Eine Reihe Ratten erhielt Linggbrunnen, eine zweite Lullusbrunnen, in beiden Fällen ohne Kohlensäure, eine dritte Rattenserie bekam zur Kontrolle Leitungswasser. Der Brunnen und das Wasser wurden jeden Tag frisch gegeben. Die Ratten, die Brunnen bekamen, erhielten außerdem kein Wasser mehr. Die Feststellung der aufgenommenen Brunnenmenge fand ebenfalls alle acht Tage statt. Dazu wurden die Saugflaschen morgens mit 30 ccm Brunnen bzw. Leitungswasser gefüllt und am anderen Morgen die übriggebliebene Menge abgemessen. Aus der Differenz der beiden Zahlen ergab sich wie beim Brot die aufgenommene Wassermenge. Gleichzeitig achtete ich auch auf die Beschaffenheit der Stühle.

Die Ratten wurden am geringsten durch den Linggbrunnen beeinflusst (Tabelle 10). Von den zwölf Tieren entleerten neun während der Versuchszeit durchweg normalen braun-schwarzen Kot. Nur bei Ratte 2, 11 und 12 war vorübergehend das Auftreten etwas hellerer weicher Faeces zu beobachten. Von den „Lullusratten“ (Tabelle 11) hatte nur Nr. 29 dauernd normalen Stuhl. Bei allen elf anderen Ratten waren die Faeces über längere Zeit, zum Teil die ganze Versuchsdauer über heller und weicher, manchmal sogar, besonders im Anfang ganz hell und dünnbreiig. Die Ratten, die Leitungswasser erhalten hatten, nahmen bezüglich ihrer Stuhlbeschaffenheit eine Mittelstellung zwischen den Lingg- und Lullustieren ein (Tabelle 12). Der Kot von acht dieser Ratten ließ dauernd normale Beschaffenheit erkennen, d. h. er war fest und braun-schwarz, sieben Tiere wiesen meist nur für kurze Zeit hellere weiche Stühle auf.

Es wurden in diesen Versuchen die Ratten nur durch den Lullusbrunnen ziemlich regelmäßig so beeinflusst, daß sie diarrhoische Stühle bekamen, damit also seine Abführ-

wirkung erkennen ließen. Beim Leitungswasser kann man kaum und beim Linggbrunnen erst recht nicht von einer Abführwirkung sprechen. Ein Zusammenhang zwischen aufgenommener Brunnenmenge und Abführwirkung ließ sich nicht feststellen. Was die gefressene Brotmenge betrifft, so haben alle Ratten ungefähr gleich viel Brot gefressen, sodaß von dieser Seite her die abführende Wirkung wohl nicht beeinflußt ist.

d) Körpergewicht.

Zur Prüfung des Einflusses von Lingg- und Lullusbrunnen auf das Körpergewicht dienten einmal dieselben Ratten wie bei der Prüfung auf Abführwirkung. Ergänzend sei zur Versuchsanordnung bemerkt, daß alle Ratten ungefähr gleich alt waren (innerhalb von drei Tagen geboren) und zwischen 36 und 65 Gramm wogen. Außer den in dem erwähnten Versuch gemachten Bestimmungen wurden die Ratten neun Wochen lang jede Woche einmal gewogen. Zum anderen schienen die Blutzuckerkaninchen für diese Untersuchung geeignet. Ihr Gewicht war vor und nach der achttägigen Brunnenzufuhr bestimmt worden.

Wenn man die Gewichtszunahmen der Ratten unter dem Einfluß von Lingg-, Lullusbrunnen und Leitungswasser vergleicht, fällt auf, daß die einzelnen Ratten, die denselben Brunnen bekommen haben, sehr verschieden große Gewichtszunahme aufweisen (Tabelle 13, 14, 15). Sehr eindrucksvoll ist diese auffällige Erscheinung bei den Tieren Nr. 21 und 25, die beide das Ausgangsgewicht von 42 Gramm haben. Die eine wiegt nach neun Wochen 120 Gramm, die andere aber nur 76 Gramm, trotzdem beide den gleichen Lullusbrunnen bekommen haben. Wie aus Tabelle 11 ersichtlich ist, nahmen beide Ratten im Durchschnitt gleich viel Brunnen zu sich, Brot hat die zweite allerdings durchschnittlich etwas weniger gefressen. Aber zur Erklärung der Wachstumsdifferenz dürfte das nicht ausreichen. Trotzdem sich die einzelnen Tiere so verschieden verhielten, wurde die durchschnittliche Gewichtszunahme jeder der drei Serien errechnet und in Kurvenform wiedergegeben (Abbildung 10). Es ergab sich, daß die Linggtiere am meisten zugenommen hatten, es folgen die Leitungswassertiere, dann die Lullustiere. Im Endergebnis sind die Unterschiede aber so gering, zwischen den Lingg- und Lullustieren nur 3,4 Gramm während neun-

wöchentlicher Beobachtung, daß man wohl nicht berechtigt ist, daraus irgendwelche Schlüsse zu ziehen, zumal die Ratten sich innerhalb der einzelnen Serien so unterschiedlich verhielten.

Die Ergebnisse der Gewichtsbestimmungen bei den Blutzuckerkaninchen sind demgegenüber besser zu verwerten (Tabelle 16). Von den zehn Linggkaninchen zeigten sechs innerhalb von acht Tagen eine Zunahme von 4,5 % bis 7,1 % ihres Anfangsgewichtes. Ein Tier hatte nur 0,7 % zugenommen, ein weiteres war auf seinem alten Gewicht stehen geblieben, zwei hatten abgenommen. Von den Kaninchen, die gleichzeitig mit Lingg- und Lullusbrunnen behandelt worden waren, ließ sich bei vier Tieren eine Gewichtsabnahme bis zu 13,9 % beobachten, nur ein Kaninchen hatte etwas zugenommen (1,3 %). Die Leitungswassertiere hatten alle abgenommen. Der Linggbrunnen bewirkte also überwiegend eine Vermehrung des Körpergewichtes, die Kombination beider Brunnen dagegen Gewichtsabnahme. Da der Linggbrunnen allein zu Gewichtsvermehrung führt und die Kombination des Lullus- und Linggbrunnens trotzdem Verringerung des Körpergewichtes zur Folge hat, darf man letztere Wirkung wohl auf den Einfluß des Lullusbrunnens zurückführen.

VII. Schlußbetrachtung.

Für die unterschiedlichen Wirkungen des Lingg- und Lullusbrunnens dürfte deren verschiedenartiger Ionengehalt maßgebend sein (Tabelle 17). Der Lullusbrunnen ist eine alkalisch-sulfatische (Glaubersalz-)Quelle, der Linggbrunnen eine muriatisch-salinische Bittersalzquelle. Letzterer unterscheidet sich vom Lullusbrunnen durch seinen größeren Gehalt an Kochsalz, jedoch ist er ärmer an Glaubersalz. Außerdem enthält der Linggbrunnen therapeutisch wirksame Mengen Jodion und Kieselsäure (R o n g e⁹⁶). Die Ergebnisse der vorliegenden Tierversuche lassen darauf schließen, daß beide Hersfelder Mineralwasserquellen in verschiedenartiger Weise therapeutisch gut verwendbar sind. Die derart objektiv festgestellten Wirkungen bilden jedoch nur einen Teil der in Bad Hersfeld erfahrungsgemäß erzielten Heilerfolge. Die Mineralbrunnen werden erst dann ihre volle Wirksamkeit entfalten, wenn ihre dosierte Verabreichung mit den anderen Heilbehandlungen im Kurort selbst, insbesondere mit einer entsprechend eingestellten Diät kombiniert wird (P f a n n e n s t i e l⁸⁶), R o n g e⁹⁵ ⁹⁶ ⁹⁷)).

VIII. Zusammenfassung.

Im Tierversuch wurden folgende Wirkungen des Hersfelder Lingg- und Lullusbrunnen festgestellt:

1. Alimentär hyperglykämische Kaninchen weisen nach achttägiger Zufuhr von natürlichem Linggbrunnen (ohne Kohlensäure) eine deutliche Senkung der Blutzuckernüchternwerte auf.

2. Im S t a u b'schen Doppelbelastungsversuch ist nach achttägiger Gabe von natürlichem Linggbrunnen (ohne Kohlensäure) nicht regelmäßig eine Senkung der zweiten Blutzuckerkurve bei Kaninchen mit alimentärer Hyperglykämie feststellbar, lediglich die Vierstundenwerte sind fast immer beträchtlich gesenkt.

3. Bei Kaninchen, die acht Tage lang nur mit Kartoffeln gefüttert sind, läßt sich im direkten Versuch nach J u s a t z nur eine ganz geringe Wirkung des natürlichen Linggbrunnens (ohne Kohlensäure) auf den Blutzucker beobachten.

4. Der Blutzuckernüchternwert von Kaninchen wird nach achttägiger Brunnengabe von künstlich mit Kohlensäure versetztem Linggbrunnen nicht gesenkt.

5. Der künstlich mit Kohlensäure versetzte Linggbrunnen zeigt bei Kaninchen mit alimentär erhöhtem Blutzucker nach achttägiger Einwirkung im S t a u b'schen Doppelbelastungsversuch überwiegend eine Senkung der zweiten Kurve; die Vierstundenwerte sind zum Teil beträchtlich gesenkt.

6. Im direkten Versuch nach J u s a t z läßt der künstlich mit Kohlensäure versetzte Linggbrunnen keinen Erfolg auf den Blutzuckerspiegel erkennen.

7. Kaninchen mit alimentär-hyperglykämischen Blutzuckerkurven, die acht Tage lang Linggbrunnen und zehn bis fünfzehn Minuten später Lullusbrunnen (beide ohne Kohlensäure) im Verhältnis 1 : 2 erhalten haben, zeigen im S t a u b'schen Doppelbelastungsversuch keinen deutlichen Einfluß der Wirkung des Linggbrunnens auf die

des Lullusbrunnens, d. h. die durch B u h l a n festgestellte gute blutzuckersenkende Wirkung des Lullusbrunnens wird durch den Linggbrunnen nicht mehr verbessert.

8. Die durch vierwöchige Mangelfütterung sehr gesunkene Blutbakterizidie von Kaninchen steigt bei etwa dreiwöchiger Zufuhr von enteistem kohlensäurefreien Lullusbrunnen nicht regelmäßig, von kohlensäurehaltigem Lullusbrunnen dagegen beträchtlich an.

9. Natürlicher Linggbrunnen ohne Kohlensäurezusatz bewirkt bei Kaninchen, die in ihrer Resistenz durch Mangelfutter herabgesetzt sind, keine Steigerung der Blutbakterizidie; dagegen erhöht der mit Kohlensäure versetzte Linggbrunnen die Bakterizidie erheblich.

10. Bei einer Beobachtungszeit von einigen Wochen vermag Lullusbrunnen ohne Kohlensäurezusatz bei weißen Ratten fast immer Abführwirkung hervorzurufen; dieser Effekt steht mit der aufgenommenen Brunnenmenge nicht in Zusammenhang.

11. Linggbrunnen ohne Kohlensäurezusatz bedingt bei weißen Ratten während einer Versuchsdauer von mehreren Wochen im allgemeinen keine Abführwirkung.

12. Ein Einfluß von Lingg- oder Lullusbrunnen auf das Wachstum junger weißer Ratten ist nach einer Beobachtungszeit von neun Wochen nicht sicher festzustellen.

13. Linggbrunnen mit und ohne Kohlensäure ruft bei einseitig mit Kartoffeln gefütterten Kaninchen in acht Tagen meist eine deutliche Gewichtsvermehrung hervor.

14. Nach achttägiger gleichzeitiger Zufuhr von Lingg- und Lullubrunnen, beide ohne Kohlensäurezusatz, findet bei Kaninchen, die mit einseitiger Kartoffelkost ernährt wurden, ebenso wie nach Leitungswasserzufuhr eine Verminderung des Körpergewichtes statt.

IX. Abbildungen

Abbildung 1 (Tier 7)

Linggbrunnen ohne Kohlensäure, acht Tage lang zugeführt.





Abbildung 2 (Tier 11)

Linggbrunnen ohne Kohlensäure, acht Tage lang zugeführt.



Zeichen: ↓ = Belastung mit Glukose
 — = Blutzucker vor der Brunnenzufuhr
 - - - = Blutzucker nach der Brunnenzufuhr

Abbildung 3 (Tier 1—4)

Linggbrunnen ohne Kohlensäure, direkter Versuch.




Abbildung 4 (Tier 15)

Linggbrunnen mit Kohlensäure, acht Tage lang zugeführt.




Abbildung 5 (Tier 16)

Linggbrunnen mit Kohlensäure, acht Tage lang zugeführt




Abbildung 6 (Tier 12—14)

Linggbrunnen mit Kohlensäure, direkter Versuch.




Abbildung 7 (Tier 18)

Lingg- und Lullusbrunnen, beide ohne Kohlensäure,
acht Tage lang zugeführt.




Abbildung 8 (Tier 20)

Lingg- und Lullusbrunnen, beide ohne Kohlensäure,
acht Tage lang zugeführt.




Abbildung 9 (Tier 23)

Leitungswasser, acht Tage lang zugeführt.





Abbildung 10 (Ratten)

Durchschnittliche Gewichtszunahme von Ratten
bei Brunnenzufuhr,

X. Tabellen.

Tabelle 1.

Linggbrunnen ohne Kohlensäure, acht Tage lang zugeführt.

Tier	Vor der Brunnenzufuhr		Nach der Brunnenzufuhr	
	Nüchternwert	Vierstundenwert nach 2 mal. Bel.	Nüchternwert	Vierstundenwert nach 2 mal. Bel.
5	118	106	101 (−17)	113 (+ 7)
6	137	122	123 (−14)	161 (+39)
7	123	148	91 (−32)	118 (−30)
8	134	243	91 (−43)	191 (−52)
9	131	171	118 (−13)	102 (−69)
10	115	177	109 (− 6)	127 (−50)
11	102	158	76 (−36)	111 (−47)

Tabelle 2.

Linggbrunnen ohne Kohlensäure, direkter Versuch.

Tier	Nüchternwert	Höchstwert nach 1. Bel.	Höchstwert nach 2. Bel.	Vierstundenwert
1	90	169	149	107
2	110	178	155	118
3	100	158	165	150
4	106	178	149	135

Tabelle 3.

Linggbrunnen mit Kohlensäure, acht Tage lang zugeführt

Tier	Vor der Brunnenzufuhr		Nach der Brunnenzufuhr	
	Nüchternwert	Vierstundenwert nach 2 mal. Bel.	Nüchternwert	Vierstundenwert nach 2 mal. Bel.
15	89	191	108 (+19)	146 (−45)
16	78	187	105 (+27)	177 (−10)
17	113	165	103 (−10)	105 (−60)

Tabelle 4.

Linggbrunnen mit Kohlensäure, direkter Versuch.

Tier	Nüchtern- wert	Höchstwert nach 1. Bel.	Höchstwert nach 2. Bel.	Vierstunden- wert
12	98	182	185	132
13	100	195	222	214
14	86	172	229	166

Tabelle 5.

Lingg- und Lullusbrunnen gleichzeitig acht Tage lang zugeführt.

Tier	Vor der Brunnenzufuhr		Nach der Brunnenzufuhr	
	Nüchtern- wert	Vierstunden- wert nach 2 mal. Bel.	Nüchtern- wert	Vierstunden- wert nach 2 mal. Bel.
18	115	202	101 (-14)	150 (-52)
19	98	142	94 (-4)	128 (-14)
20	115	169	85 (-30)	73 (-96)
21	109		97 (-12)	
25	197		49 (-48)	

Tabelle 6.

Leitungswasser, acht Tage lang zugeführt.

Tier	Vor der Wasserzufuhr		Nach der Wasserzufuhr	
	Nüchtern- wert	Vierstunden- wert nach 2 mal. Bel.	Nüchtern- wert	Vierstunden- wert nach 2 mal. Bel.
22	120	190	124 (+4)	198 (+8)
23	98	205	107 (+9)	201 (-4)

Tabelle 7.

Bakterizider Index
vor und nach Zufuhr von Lullusbrunnen.

Kaninchen	Dauer der Brunnenzufuhr in Tagen	Bakterizider Index	
		vor der Brunnenzufuhr	nach der Brunnenzufuhr
a) Lullusbrunnen ohne CO ₂			
42	25	1,36	2,29
43	23	1,44	1,67
44	20	1,60	1,25
46	18	1,50	2,40
50	20	1,64	1,56
58	18	2,73	2,57
b) Lullusbrunnen mit CO ₂			
36	21	1,42	2,22
37	21	1,41	2,86
38	23	1,36	2,15
39	25	1,19	2,14
40	25	1,56	1,98
41	23	1,81	1,53

Tabelle 8.

Bakterizider Index
vor und nach Zufuhr von Linggbrunnen.

Kaninchen	Dauer der Brunnenzufuhr in Tagen	Bakterizider Index	
		vor der Brunnenzufuhr	nach der Brunnenzufuhr
a) Linggbrunnen ohne CO ₂			
26	26	1,81	1,14
27	26	1,67	1,25
28	20	1,94	1,51
29	20	1,88	1,91
30	18	2,64	1,87
31	18	1,69	1,59
32	26	1,63	1,67
33	26	2,72	1,66
b) Linggbrunnen mit CO ₂			
47	18	1,89	3,25
54	19	2,36	2,66
55	18	2,20	3,40
56	17	1,87	3,23
57	18	2,12	4,46

Tabelle 9.
Bakterizider Index
vor und nach Zufuhr von Leitungswasser

Kaninchen	Dauer der Brunnenzufuhr in Tagen	Bakterizider Index	
		vor der Brunnenzufuhr	nach der Brunnenzufuhr
a) Leitungswasser ohne CO ₂			
34	26	2,22	2,19
35	26	2,10	2,35
48	18	1,64	1,64
49	19	1,82	2,02
51	18	2,60	2,63
b) Leitungswasser mit CO ₂			
45	18	2,00	1,33
52	20	1,88	2,71
53	19	2,68	2,87
59	18	2,01	2,45

Tabelle 10.

L i n g g brunnen

Brunnen in ccm, Brot in gr,	Stuhl: + = fest	D = dunkel
Wenn bei „Stuhl“ nichts angegeben,	o = weich	H = hell
Stuhl normal (+D)	— = breiig	HD = mittel

Ratte		Untersuchungstag:							Durch-	
		7	14	21	28	35	42	56	schnitte Brot	Wasser
1	Brot:	16	13	15	13	19	14	14	14,9	15,7
	Wasser:	11	7	14	14	9	25	30		
	Stuhl:	+D								
2	Brot:	16	22	15	16	20	15	14	16,9	22,4
	Wasser:	12	28	30	24	20	26	17		
	Stuhl:	oH	+D							
4	Brot:	21	15	18	17	20	15	16	17,4	28,9
	Wasser:	25	30	30	30	27	30	30		
	Stuhl:	+D								
5	Brot:	17	16	15	13	19	18	15	16,1	10,9
	Wasser:	8	12	8	13	9	9	17		
	Stuhl:	+D								
7	Brot:	11	9	16	14	19	15	14	14,0	14,9
	Wasser:	9	10	10	11	18	25	21		
	Stuhl:	+D								
8	Brot:	20	16	18	17	19	20	13	17,6	17,9
	Wasser:	9	10	18	23	23	25	17		
	Stuhl:	+D								
9	Brot:	17	20	18	16	19	19	17	18,0	20,6
	Wasser:	12	27	29	25	13	20	18		
	Stuhl:	+D								
11	Brot:	15	22	19	17	19	19	16	18,1	18,9
	Wasser:	10	17	26	30	13	17	19		
	Stuhl:	+D	+D	+D	oHD	oHD	+D	+D		
12	Brot:	17	26	16	18	16	15	16	17,7	8,3
	Wasser:	10	9	7	8	5	8	11		
	Stuhl:	oD	oHD	+D						
14	Brot:	19	22	18	16	23	18	15	18,7	14,9
	Wasser:	21	30	14	13	6	12	8		
	Stuhl:	+D								
17	Brot:	15	16	15	18	23	25	12	17,7	19,0
	Wasser:	14	17	30	22	16	20	24		
	Stuhl:	+D								
19	Brot:	16	17	15	15	20	16	15	16,3	11,6
	Wasser:	3	12	14	10	14	12	16		
	Stuhl:	+D								

Tabelle 11.

Lullusbrunnen

Brunnen in ccm, Brot in gr, Stuhl: + = fest D = dunkel
 Wenn bei „Stuhl“ nichts angegeben, o = weich H = hell
 Stuhl normal (+D) — = breiig HD = mittel

Ratte	Untersuchungstag:								Durchschnitt	
		7	14	21	28	35	42	56	Brot	Wasser
21	Brot:	17	19	16	22	17	19	18	18,3	13,9
	Wasser:	6	10	12	15	19	20	15		
	Stuhl:	oHD	oHD	oHD	+D					
25	Brot:	13	16	19	15	13	15	18	15,6	13,1
	Wasser:	8	8	14	15	14	22	11		
	Stuhl:	+D	+D	+D	oHD	oHD	+D	+D		
26	Brot:	16	15	17	17	16	16	19	16,6	7,6
	Wasser:	17	6	5	9	4	3	9		
	Stuhl:	oHD	oHD	oHD	+D					
28	Brot:	13	17	19	19	18	20	18	17,7	24,0
	Wasser:	30	22	30	23	20	28	15		
	Stuhl:	H	oHD	oHD	oHD	oHD	oHD	+D		
29	Brot:	13	17	17	16	19	16	20	16,9	21,5
	Wasser:	17	22	18	27	?	28	17		
	Stuhl:	+D								
30	Brot:	13	18	18	18	18	19	21	17,9	9,0
	Wasser:	8	6	6	9	8	14	12		
	Stuhl:	oH	oHD	oHD	+D	+D	+D	oHD		
31	Brot:	16	18	17	18	19	16	21	17,9	13,2
	Wasser:	6	14	22	12	?	18	17		
	Stuhl:	+D	-H	-H	-H	oHD	+D	+D		
32	Brot:	12	16	18	19	20	16	19	17,1	8,6
	Wasser:	10	9	14	7	8	11	11		
	Stuhl:	-H	oHD	oHD	oHD	oHD	-H	oHD		
36	Brot:	18	16	19	17	17	18	15	17,1	11,0
	Wasser:	14	11	18	7	8	11	8		
	Stuhl:	-H	oHD	oHD	oHD	+D	oHD	oHD		
37	Brot:	16	15	12	14	13	15	17	14,6	10,7
	Wasser:	8	6	6	11	11	18	15		
	Stuhl:	oH	oHD	oHD	+D	+D	+D	+D		
38	Brot:	23	18	21	20	20	20	19	20,1	26,5
	Wasser:	15	29	30	27	30	30	24		
	Stuhl:	-H	oHD	oHD	+D	oHD	oD	+D		
40	Brot:	19	16	19	16	19	19	18	18,0	13,1
	Wasser:	14	9	11	13	13	12	20		
	Stuhl:	+D	oHD	+D	oHD	oHD	+D	oHD		

Tabelle 12.

Leitungswasser

Wasser in ccm, Brot in gr, Stuhl: + = fest D = dunkel
 Wenn bei „Stuhl“ nichts angegeben, o = weich H = hell
 Stuhl normal (+D) — = breiig HD = mittel

Ratte	Untersuchungstag:							Durch-	
	7	14	21	28	35	42	56	schnitte	
								Brot	Wasser
62	Brot:	17	23	17	17	20	20	22	19,4
	Wasser:	5	8	12	13	10	10	14	10,3
	Stuhl:	+D							
64	Brot:	25	17	16	18	23	18	22	19,9
	Wasser:	13	13	6	11	18	16	15	13,1
	Stuhl:	+D							
65	Brot:	16	21	16	19	19	18	19	18,3
	Wasser:	13	10	13	18	23	18	15	15,7
	Stuhl:	+D				oHD	oHD	oHD	
67	Brot:	16	15	19	20	20	17	21	18,3
	Wasser:	6	11	13	11	12	14	16	11,9
	Stuhl:	+D	+D	oHD	oHD	oHD	+D	+D	
68	Brot:	17	16	17	18	19	18	17	17,4
	Wasser:	4	7	5	5	5	8	13	6,7
	Stuhl:	+D							
69	Brot:	17	19	18	19	22	20	21	13,4
	Wasser:	5	6	4	6	7	9	14	7,3
	Stuhl:	+D							
70	Brot:	22	19	21	17	19	14	20	18,7
	Wasser:	12	16	8	12	6	13	15	11,7
	Stuhl:	+D	+D	oHD	+D				
71	Brot:	13	18	19	20	16	13	20	17,0
	Wasser:	13	16	10	?	12	16	18	14,2
	Stuhl:	+D							
72	Brot:	?	?	19	21	21	22	21	20,4
	Wasser:	?	16	7	12	10	13	8	11,0
	Stuhl:	+D							
75	Brot:	15	17	18	19	20	17	21	18,1
	Wasser:	11	7	10	10	10	11	16	10,7
	Stuhl:	oHD	oHD	+D					
76	Brot:	19	16	22	22	17	19	21	19,4
	Wasser:	9	8	8	8	4	8	7	7,6
	Stuhl:	+D							
78	Brot:	17	20	20	20	21	21	21	20,0
	Wasser:	8	8	10	?	11	14	9	10,0
	Stuhl:	+D	+D	+D	+D	oHD	oHD	oHD	
79	Brot:	17	17	17	19	20	17	19	18,0
	Wasser:	28	21	14	15	11	18	17	17,7
	Stuhl:	+D							
80	Brot:	19	15	18	19	21	22	25	19,9
	Wasser:	15	13	7	11	9	19	17	13,0
	Stuhl:	+D	+D	+D	oHD	oHD	oHD	+D	
81	Brot:	17	17	17	19	18	22	22	18,9
	Wasser:	10	9	6	5	6	8	7	7,3
	Stuhl:	+D	+D	+D	—H	+D	+D	oHD	

Tabelle 13.

Lingg. (Gewicht in Gramm)

Nr. der Ratte	Tage seit Beginn des Versuches										Gewichts- zunahme in 9 Wochen
	0	6	13	20	27	34	40	49	56	63	
1	36	37	48	54	59	65	72	82	89	90	54
2	49	53	64	74	83	91	100	110	117	120	71
4	57	58	71	75	81	87	95	99	105	106	49
5	50	55	65	72	76	82	89	93	95	100	50
7	41	44	48	55	60	69	76	85	90	96	55
8	57	64	68	76	80	87	89	102	107	116	59
9	52	56	68	74	83	94	103	119	124	130	78
11	42	45	52	61	69	74	76	83	88	93	51
12	57	61	69	76	73	82	90	95	100	102	45
14	49	57	67	75	77	85	93	102	110	117	68
17	47	51	58	63	68	73	80	88	92	97	50
19	53	56	61	69	75	80	85	93	99	101	48
	0	3,9	12,4	19,5	24,5	31,6	38,1	46,7	52,1	56,5	

Die unterste Reihe gibt die durchschnittlichen Gewichtszunahmen an.

Tabelle 14.

Lullus. (Gewicht in Gramm)

Nr. der Ratte	Tage seit Beginn des Versuches										Gewichts- zunahme in 9 Wochen
	0	6	13	20	27	34	40	49	56	63	
21	42	52	56	73	76	88	96	107	115	120	78
25	42	44	47	54	59	63	66	73	74	76	34
26	65	71	72	69	75	78	82	89	91	93	28
28	61	67	73	76	85	91	98	104	110	117	56
29	42	47	53	54	59	64	75	87	88	92	50
30	42	44	49	57	64	71	80	91	93	100	58
31	46	49	51	51	56	65	75	93	97	105	59
32	63	65	67	70	76	78	88	90	91	95	32
36	57	64	68	72	79	83	94	96	101	103	46
37	39	42	51	57	57	64	73	83	84	94	55
38	50	58	68	77	85	97	103	110	112	124	74
40	65	72	80	81	88	95	101	114	123	132	67
	0	5,1	10,1	14,7	20,3	27,6	34,7	43,6	47,1	53,1	

Die unterste Reihe gibt die durchschnittlichen Gewichtszunahmen an.

Tabelle 15.

Leitungswasser. (Gewicht in Gramm)

Nr. der Ratte	Tage seit Beginn des Versuches										Gewichts- zunahme in 9 Wochen
	0	6	13	20	27	34	40	49	56	63	
62	46	51	54	65	70	74	78	90	95	104	58
64	53	56	62	69	73	83	90	102	108	110	57
65	36	48	54	63	69	73	78	90	96	101	55
67	57	60	68	69	73	74	83	87	89	91	34
68	38	43	45	58	62	74	89	91	95	102	64
69	53	60	66	72	74	79	90	103	106	112	59
70	40	47	56	65	67	72	79	88	93	100	60
71	60	71	75	83	80	84	94	94	98	106	46
72	39	46	48	60	66	75	81	92	96	104	65
75	45	51	54	62	65	72	77	88	89	98	53
76	49	56	60	68	73	83	90	96	101	108	59
78	57	68	72	78	79	80	86	96	100	108	51
79	41	47	54	64	69	75	81	85	90	93	52
80	40	48	49	56	60	67	76	86	94	97	57
81	42	52	63	66	74	79	86	96	101	106	64
	0	6,5	11,6	19,4	23,2	29,2	36,8	45,2	49,6	55,6	

Die unterste Reihe gibt die durchschnittlichen Gewichtszunahmen an.

Tabelle 16.

Gewichtsveränderung von Kaninchen nach achttägiger Brunnenzufuhr.

Tier	Gewicht vorher in Gramm	Gewicht nachher in Gramm	Gewichts- veränderung in Gramm	Gewichts- veränderung in Prozent
------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	--

a) Lingggbrunnen ohne Kohlensäure:

5	2700	2850	+150	+ 5,5
6	3300	3450	+150	+ 4,5
7	3000	3150	+150	+ 5,0
8	1950	2040	+ 90	+ 4,6
9	3880	3880	± 0	± 0
10	2070	1880	-190	- 9,2
11	2710	2730	+ 20	+ 0,7

b) Linggbrunnen mit Kohlensäure:

15	2100	2250	+150	+ 7,1
16	1950	2080	+130	+ 6,7
17	2910	2770	-140	- 4,8

c) Lingg- und Lullus ohne Kohlensäure:

18	3610	3110	- 500	-13,9
19	2220	2130	- 90	- 4,1
20	3090	3130	+ 40	+ 1,3
21	2680	2630	- 50	- 1,9
25	2350	2090	-260	-11,1

d) Leitungswasser:

22	3200	3070	-130	- 4,1
23	2800	2770	- 30	- 1,1
24	3580	3300	-280	- 7,8

Tabelle 17.

Analyse des Lingg- und Lullusbrunnens

	Linggbrunnen	Lullusbrunnen
Jahr der Untersuchung	1929	1905
Analytiker	R. Fresenius u. L. Fresenius	E. Hintz und L. Grünhut
Temperatur	10,9° C	10,5° C
In 1 Kilogramm sind enthalten Gramm:		
Kationen:		
Kalium-Ion (K ⁺)	0,02991	0,01681
Natrium-Ion (Na ⁺)	1,147	0,9604
Lithium-Ion (Li ⁺)	0,000124	0,000246
Calcium-Ion (Ca ⁺⁺)	0,2244	0,3089
Strontium-Ion (Sr ⁺⁺)	0,004217	0,006501
Magnesium-Ion (Mg ⁺⁺)	0,05159	0,03763
Zink-Ion (Zn ⁺⁺)	—	0,004304
Ferro-Ion (Fe ⁺⁺)	0,000590	0,05551
Mangano-Ion (Mn ⁺⁺)	0,000106	0,000297
Aluminium-Ion (Al ⁺⁺⁺)	0,000337	—
Anionen:		
Nitrat-Ion (NO ₃ ⁻)	0,07907	0,003764
Chlor-Ion (Cl ⁻)	1,447	0,3532
Brom-Ion (Br ⁻)	0,000454	0,000136
Jod-Ion (J ⁻)	0,000172	0,000003
Sulfat-Ion (SO ₄ ⁼⁼)	0,8491	1,934
Hydrophosphat-Ion (HPO ₄ ⁼⁼)	0,000110	0,000018
Hydroarsenat-Ion (HAsO ₄ ⁼⁼)	—	0,000040
Hydrocarbonat-Ion (HCO ₃ ⁻)	0,3955	0,7698
	4,230	4,452
Borsäure (meta) (HBO ₂)	0,001115	0,002952
Kieselsäure (meta) (H ₂ SiO ₃)	0,02106	0,01465
Freies Kohlendioxyd (CO ₂)	—	0,0101
	4,252	4,479

XI. Schriftennachweis.

(Wenn ein * vor der angegebenen Stelle steht, wurde nicht die Originalarbeit, sondern ihr Referat in den „Berichten über die gesamte Physiologie und experimentelle Pharmakologie“ benutzt).

- 1 Abel und Geiling . *Journ. of pharmacol. a. exper. therapeut.
25, S. 423 (1925)
- 2 Abelin *Biochem. Zeitschrift 199, S. 72 (1928).
- 3 Abelin und Goldener . Klin. Wochenschrift 4, S. 2446 (1925).
- 4 Alston , , *Brit. Journ. exper. Path. 9, S. 300 (1928).
- 5 Arnoldi Münch. med. Wochschr. 69, S. 1078 (1922)
- 6 Arnoldi Z. klin. Med. Bd. 94 (1922), zit. nach Nr. 5.
- 7 Arnoldi *Zeitschr. exper. Med. 73, S. 452 (1930).
- 8 Arnoldi *Zeitschr. exper. Med. 75, S. 64 (1931).
- 9 Arnoldi und Ettinger . Klin. Wochschr. 1922, S. 2082.
- 10 Arnoldi und Kucera . *Zeitschr. exper. Med. 79, S. 311 (1931).
- 11 Arnoldi u. Roubitschek Dtsche. med. Wochschr. 1922, S. 250.
- 12 Arnoldi u. Roubitschek Münch. med. Wochschr. 1923 S. 702.
- 13 Arnoldi u. Roubitschek Münch. med. Wochschr. 1926, S. 1106.
- 14 Arnoldi u. Zimmermann *Med. Klin. 22, S. 1029 (1926)
- 15 Barcroft J. of biol. Chem. 3 (1907), zit. nach Nr. 121.
- 16 Beckmann Der Balneologe 1, S. 104 (1934).
- 17 Bickel Arch. f. Baln. u. med. Klimatol. 1, S. 409 (1926).
- 18 Bickel und Kauffmann=Cosla Klin. Wochschr. 4, S. 1343 (1925).
- 19 Blum und Aubel Compt. rendus de la soc. de biol. 96, S. 1301 (1927)
- 20 von Bokai Arch. exper. Path. 23, S. 209 (1887), zit. nach Nr. 124.
- 21 Buchheim Arch. f. physiol. Heilkde. 12, S. 217, zit. nach Nr. 22.
- 22 Buchheim Arch. f. physiol. Heilkde. 13, S. 93 (1854).
- 23 Buchstab u. Sribner . *Zeitschr. f. klin. Med. 105, S. 669 (1927).

- 24 Buhlan Inaug. Diss. Marburg 1935, Heft 3 der
Arbeiten aus der Staatl. Forschungsabtlg.
f. Kurortwiss. und med. Klimatol.
- 25 Bürgi Dtsche. med. Wochschr. 53, S. 222 (1927).
- 26 Bürgi und Gordonoff Klin. Wochschr. 5. S. 466 (1926).
- 27 Campanacci u. Bal-
ducci Klin. Wochschr. 5, S. 2166 (1926).
- 28 Cobet Arch. ges. Physiol. 150 S. 325 (1913).
- 29 Collum Amer. J. Physiol. 10 (1903), zit. nach Nr.
121.
- 30 Dehnicke *Zeitschr. physik. Ther. 24, S. 380 (1920).
- 31 Diener und Witsch Zeitschr. physik. Ther. 33, S. 149 (1927).
- 32 Eichhoff und Pfan-
nenstiel Zentrbl. Bakt. I, Bd. 106, S. 31 (1928).
- 33 Elias Biochem. Zeitschr. 48, S. 120 (1913).
- 34 Elias *Ergebn. inn. Med. und Kinderheilkunde
25, S. 192 (1924).
- 35 Elias und Kolb Biochem. Zeitschr. 52, S. 331 (1913).
- 36 Elias und Popescu
Inotesti und Rados-
lav *Biochem. Zeitschr. 138, S. 284 (1923).
- 37 Elias und Popescu
Inotesti und Rados-
lav *Biochem. Zeitschr. 138, S. 299 (1923).
- 38 Elias und Schubert Biochem. Zeitschr. 90, S. 229 (1918).
- 39 Elias und Weiss *Berl. klin. Wochschr. 58, S. 959 (1921).
- 40 Elias und Weiss *Wien. Arch. f. inn. Med. 4, S. 29 (1922).
- 41 Erdmann Inaug. Diss. Marburg 1935.
- 42 Felsch Med. Welt 2, S. 741 (1928).
- 43 Felsch Zeitschr. f. Kurortwiss. 2, S. 156 (1933).
- 44 Freund u. Marchand zit. nach Nr. 11.
- 45 Geiger Klin. Wochschr. 1925, S. 1265.
- 46 Geiger und Kropf Arch. exper. Path. 139, S. 290 (1929).
- 47 Geiger und Kropf Arch. exper. Path. 147, S. 272 (1930).
- 48 Geiger und Kropf Arch. exper. Path. 147, S. 281 (1930).
- 49 Geiger und Loewi Klin. Wochschr. 1922, S. 1210.
- 50 Hamburger Klin. Wochschr. 1, S. 418 (1922).
- 51 Harpuder Dtsche. med. Wochschr. 1930, S. 703, S.
748, S. 1260, S. 1311.
- 52 Harpuder *Zeitschr. exper. Med. 76, S. 709 (1931).
- 53 Harpuder Zeitschr. f. Kurortwiss. 2, S. 85 (1933).
- 54 Harpuder u. Schies-
ring Zeitschr. für exper. Med. 76, S. 715 (1931)
- 55 Hilgenberg u. Pfan-
nenstiel Arch. Gynäk. 141, S. 493 (1930).

- 56 Hofmeister zit. nach Nr. 92.
- 57 Holsen Zeitschr. Vitaminf. 1, S. 3 (1932).
- 58 Juszat Klin. Wochschr. 11, S. 1189 (1932).
- 59 Juszat Dtsche. med. Wochschr. 1933, S. 1124.
- 60 Kauffmann=Cosla u.
W. Zörkendörfer Compt. rendus de la soc. de biol. 95, S. 1606 (1926).
- 61 Kauffmann=Cosla u.
W. Zörkendörfer *Compt. rendus de la soc. de biol. 96, S. 281 (1927)
- 62 Kauffmann=Cosla u.
W. Zörkendörfer u.
R. Zörkendörfer *Bull. de la soc. de chim. biol. 9, S. 174 (1927).
- 63 Kauffmann=Cosla u.
W. Zörkendörfer *Biochem. Zeitschr. 184, S. 19 (1927).
- 64 Kauffmann=Cosla u.
W. Zörkendörfer Med. Klin. 23, S. 359 (1927).
- 65 Kauffmann=Cosla u.
W. Zörkendörfer *Deutsch. Arch. klin. Mediz. 170, S. 302. (1931).
- 66 Keller=Stoppany Schweiz. med. Wochenschrift 10, S. 362 (1929).
- 67 Kionka zit. nach Nr. 28.
- 68 Kisch Klin. Wochschr. 1929, S. 695.
- 69 Kochmann Biochem. Zeitschr. 112, S. 255 (1920), zit. nach Nr. 120, 121, 124.
- 70 Kopf *Deutsche med. Wochschr. 51, S. 725 (1925)
- 71 Lampert Heilquellen und Heilklima, Dresden und Leipzig 1934, S. 43.
- 72 Lay Inaug. Diss. Marburg 1935, Heft 2 der Arbeiten aus der Staatl. Forschungsabtlg. f. Kurortwiss. und med. Klimatol.
- 73 Liebig cit. v. Leubuscher, Virch. Arch. 26, 1886, zit. nach Nr. 120.
- 74 Mayer Deutsche med. Wochschr. 48, S. 827 (1922)
- 75 Messerle Zeitschr. physik. Ther. 35, S. 57 (1928).
- 76 Meyer=Betz u. Gebhardt Münch. med. Wochschr. 1912, S. 1862.
- 77 Minkowski zit. nach Nr. 115.
- 78 Page Amer. Journ. of physiol. 66, S. 1 (1923).
- 79 Perrin und Cuénot Presse méd. 1930, S. 633.
- 80 Pfannenstiel Zeitschr. Immunf. 56, S. 389 (1928).
- 81 Pfannenstiel Verhandl. deutsch. Pharm. Ges. 1929.
- 82 Pfannenstiel Zeitschr. exper. Med. 77, S. 218 (1931).
- 83 Pfannenstiel Dermat. Wochschr. 92, S. 489 (1931).
- 84 Pfannenstiel Zeitschr. physik. Ther. 43, S. 103 (1932).
- 85 Pfannenstiel Sitz.=Ber. Ges. zur Beförd. ges. Naturwiss. Marburg 67, S. 71 (1932).

- 86 Pfannenstiel Med. Welt 1933, Nr. 27.
- 87 Pfannenstiel Münch. med. Wochschr. 1933, S. 1090.
- 88 Pfannenstiel Der Balneologe 2, S. 1 (1935).
- 89 Pfannenstiel und
Jusatz Zeitschr. exper. Med. 90, S. 540 (1933).
- 90 Pousseuille Rech. exp. etc. Paris (1828), zit. nach Nr.
120.
- 91 Forges Deutsche med. Wochschr. 1905, S. 524,
zit. nach Nr. 120 und 121.
- 92 Poulsson Lehrb. der Pharmakologie, 10. Aufl, Leip-
zig 1934, S. 345 ff.
- 93 Rademaekers und
Sollmann *Arch. internat. de pharmaco-dyn. et de
thér. 29, S. 481 (1924).
- 94 Radziejewski Arch. für Anat., Physiol. und wiss. Med.
1870, S. 37.
- 95 Ronge Umstimmungsbehandlung mit den natür-
lichen Heilmitteln der Kurorte, Bad Hers-
feld, 1933.
- 96 Ronge Med. Welt. 1934, Nr. 11
- 97 Ronge Zeitschr. der Reichsfachschaft: Technische
Assistentinnen 3, S. 1 (1936)
- 98 Roubitschek Arch. Baln. u. med. Klimatol. 1. S, 90 (1925)
- 99 Scholz Klin. Wochschr. 10, S. 1569 (1931)
- 100 Seegen Wien. med. Wochschr. 1860 } {zit nach
Sitz.-Ber. Ak. Wiss. Wien XLIX, 2f} Nr. 120
- 101 Sgalitzer Zeitschr. Baln. 1914, 7, zit. nach Nr. 74
- 102 Sick Ing. Diss. Tübingen 1859, zit. nach Nr. 120
- 103 Simó *Zeitschr. ges. physik. Ther. 33. S. 163 (1927)
- 104 Spiro Veröffentl. aus hyg. u. baln. Inst. Marien-
bad, Heft 1, S. 11 (1933) Autoreferat.
- 105 Staub Zeitschr. klin. Med. 91, S. 44 (1921)
- 106 Staub Zeitschr. klin. Med. 93, S. 89 (1922)
- 107 Staub Zeitschr. klin. Med. 93. S. 123 (1922)
- 108 Staub Zeitschr. klin. Med. 104, S. 587 (1926)
- 109 Stransky *Biochem. Zeitschr. 122, S. 1 (1921)
- 110 Tunnicliff Journ. inf. Dis. 48, S. 161 (1933)
- 111 Urbach Biochem. Zeitschr. 265, S. 390 (1933)
- 112 Veil Verhandl. dtsch. Ges. inn. Med. 1921, S. 284
- 113 Vogt Prakt. Arzt 1931, S. 217
- 114 Wagner Inaug. Diss. Dorpat 1853, zit. nach Nr. 120
- 115 Weskott Zeitschr. Kurortwiss. 2, S. 609 (1933)
- 116 Wiechowski Zeitschr. Baln. 1914, 39} zit. nach Nr. 74
- 117 Wiechowski Prager Med. Wochschr }
- 118 Wright, Colebrook und Storer The Lancet 204, I, S. 365. S. 417, S. 473
(1923)

- 119 Zörkendörfer, K. . Naturforschervers. 1920} zit. nach Nr. 120
Balneol. Zeitg. 1920, 13}
 - 120 Zörkendörfer, K. . Veröffentl. aus hyg. u. baln. Inst. Marien-
bad, Heft 1, S. 5 (1933)
 - 121 Zörkendörfer, W. u. W. Zeitschr. physik. Ther. 39, S. 214 (1930)
 - 122 Zörkendörfer, W. Arch. exper. Path. 161, S. 437 (1931)
 - 123 Zörkendörfer, W. Arch. Verdgskrkh. 53, S. 275 (1933) zit.
nach Nr. 124
 - 124 Zörkendörfer, W. Veröffentl. aus hyg. u. baln. Inst. Marien-
bad, Heft 3, S. 12 (1933).
-

Zum Schluß meiner Arbeit ist es mir eine angenehme Pflicht, Herrn Professor Dr. Pfannenstiel für die Anregung zu vorliegenden Untersuchungen meinen Dank auszusprechen.

Lebenslauf.

Ich, Hans Friedrich Wilhelm Ludwig Stern, wurde am 16. Mai 1911 als Sohn des Studienrates Karl Stern und seiner Ehefrau Maria, geborene Friehe zu Hamm in Westfalen geboren. Kurze Zeit später wurde mein Vater nach Minden in Westfalen versetzt. Hier besuchte ich von Ostern 1918 ab drei Jahre lang die Städtische Mittelschule und anschließend das Staatliche Gymnasium, an dem ich Ostern 1931 meine Reifeprüfung ablegte. Im Sommer 1931 begann ich mein medizinisches Studium in Marburg. Mit Ausnahme des dritten Semesters, wo ich in Rostock studierte, verbrachte ich die übrigen vier vorklinischen Halbjahre in Marburg. Meine klinischen Semester begann ich in München und setzte sie im siebten Semester in Königsberg fort, um sie vom achten Halbjahr ab in Marburg zu beenden. Die ärztliche Prüfung habe ich am 14. Dezember 1936 bestanden.

Meine vorklinischen Lehrer waren:

In Marburg: Alverdes, Claussen, Dittler, Göppert, Grüneisen, Jacobshagen, Kutscher, Meerwein, Nauck, Strecker.

In Rostock: Elze, Fröhlich, von Hayek, Hertwig, von Krüger, Reiter.

Meine klinischen Lehrer waren:

In München: Borst, von Müller, von Seemen, von Zumbusch.

In Königsberg: Aßmann, Erb, Kaiserling, Laubmann, Läwen.

In Marburg: Baumann, Baur, Becher, Boeminghaus, Brock, Eimer, Enke, Freudenberg, Grüter, Hempel, Jahrmärker, Kehrer, Kestermann, Klapp, Klewitz, Kretschmer, Loebell, Mauz, Mondry, Neumann, Pfannenstiel, Rix, Ruete, Schrader, Schwenkenbecher, Uffenorde, Versé.